

Notiziario agrometeorologico per l'area del Campidano

Anno II – n°11 del 25 marzo 2009
Valido fino al 31 marzo 2009

Consigli culturali



Olivo

Fase fenologica:
Raccolta delle olive

La potatura può protrarsi fino a tutto marzo. Si consiglia di lasciare i residui dei rami affastellati di potatura (fascine esca) in campo, per attirare su di essi gli adulti di tarlo del legno, **Fleotribo** (*Fleotribus scarabaeoides*). Questi ultimi andranno poi bruciati dopo qualche settimana. Negli oliveti fortemente attaccati dall'**occhio di pavone** (*Spilocaea oleaginea*) si può eseguire un intervento eradicante con prodotti rameici per favorire il distacco delle foglie macchiate dal fungo.

Frumento duro e cereali minori

Fase fenologica: 3° foglia vera inizio levata

Per i campi che si trovano nella fase compresa tra fine accostamento e inizio levata è opportuno effettuare, in concomitanza dell'intervento **diserbante** di **copertura**, un intervento **antioidico** in modo da proteggere la vegetazione da eventuali infezioni fungine favorite dal clima piovoso.



Carciofo

Fase fenologica :

Il periodo dei tagli (*spinoso sardo, violetto e tema*), sta volgendo al termine. In questa fase la ceppaia ricaccia i nuovi carducci che daranno origine alla produzione del carciofino e agli ovoli estivi da utilizzare per la selezione dei nuovi impianti. Si consiglia in questo periodo di segnalare le piante da cui non dovranno essere prelevati gli ovoli per la realizzazione degli impianti nella prossima stagione estiva (**selezione massale**). Nelle stazioni di monitoraggio ubicate nel territorio non si rilevano catture né sintomi visivi di avversità da fitofagi.

Asparago

Fase fenologica: raccolta turioni

La raccolta dei turioni è iniziata da alcune settimane. Nelle asparagie è stata segnalata la presenza della cimice verde *Nezara spp.* Laddove se ne rilevi la presenza si consiglia di effettuare un intervento insetticida a base di deltametrina per abbatterne la popolazione. Il p.a. è registrato sia per la coltura che per l'avversità. Il tempo di carenza del principio attivo è di 3 gg.



Agrumi

Fase fenologica:
raccolta, nuovi bottoni fiorali e germogli

È il momento di effettuare la potatura di produzione per contrastare l'attacco della minatrice serpentina sui nuovi germogli di maggio e luglio (*Phyllocnistis citrella*). Lo scopo è quello di far sviluppare e indurire i germogli e le foglie nel periodo primaverile in modo da limitare i danni di tale insetto nel periodo estivo.

Vite

Fase fenologica: riposo vegetativo.

Si raccomanda di potare le piante colpite dal mal dell'esca, segnalate precedentemente, e distruggere i residui di potatura. È necessario asportare completamente il legno malato. Si deve comunque, nell'arco di qualche anno, risanare il vigneto dalla malattia sostituendo ogni anno le piante morte o quelle gravemente attaccate. Con la potatura effettuare lo scortecciamento dei ceppi anneriti dalla fumaggine per mettere a nudo le femmine della cocciniglia cotonosa che in questo periodo si riparano sotto la corteccia. In seguito intervenire con un prodotto registrato in viticoltura per abbassarne la popolazione.

Previsioni del tempo

Previsioni per la serata

Cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Altri fenomeni: assenti.

Venti: moderati da Nord-Ovest con valori massimi di 11 m/s.

Tendenza per i giorni successivi

Per la giornata di venerdì si prevede cielo poco nuvoloso, il giorno seguente si avrà cielo nuvoloso con deboli precipitazioni sparse. Le temperature minime diminuiranno, le massime saranno in lieve aumento. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali e tenderanno alla variabilità sabato. I mari saranno molto mossi o agitati con moto ondoso in attenuazione.

Informazioni

