

Consigli



Carciofo

Fase fenologica: 7-10 foglie per le varietà precoci (violetto di provenza, tema, spinoso sardo).

Le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo delle infezioni oidiche (*Leveillula taurica*). Si consiglia quindi di intervenire preventivamente con prodotti a base di zolfo.

In presenza di attacchi intensi già in atto, utilizzare una delle seguenti sostanze attive sistemiche in aggiunta

allo zolfo:

Penconazolo, propiconazolo, tebuconazolo, tetraconazolo, miclobutanil, ciproconazolo, quinoxifen e azoxystrobin. Tali sostanze sono previste dal Disciplinare di produzione integrata 2012.

Pomodoro da industria

Fase fenologica: raccolta

Sono ancora in atto le operazioni di raccolta meccanica del pomodoro da industria. Nei campi tardivi si consiglia verificare la presenza della cimice verde (*Nezara viridula*). In caso di forti attacchi, intervenire con prodotti a base di deltametrina tenendo presente che il Disciplinare di Produzione integrata prevede l'utilizzo di massimo tre interventi con piretroidi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità.

Vite

Fase fenologica: inizio maturazione

In questo periodo è bene evidenziare con nastro segnaletico, canne o altro, i ceppi che manifestano i sintomi del mal dell'esca, che in inverno dovranno essere potati separatamente per evitare il contagio delle piante sane.